



Sobre a Capa - O Grito (Munch)

Edvard Munch
Pintor e gravador norueguês (1863 - 1944). Estudou em Oslo e em 1890 deixou a Noruega, somente regressando 18 anos depois. Durante essa ausência esteve em Paris (onde sofreu influência de Van Gogh, Pissarro, Lautrec, Gauguin), em Berlim e na Itália.

À sombra de tais personalidades cresceu a sua própria, nutrida de dolorosas reminiscências da infância. Seus temas favoritos eram a miséria, a enfermidade e a morte embora também viesse a executar retratos e mesmo painéis decorativos.

O retorno à Noruega deu-se em 1908: a temática e o colorido trágicos do artista se atenuam em obras como os afrescos da universidade de Oslo. É, porém, a obra de Munch anterior a 1908 que lhe garante lugar de relevo na história da arte moderna. Foi o precursor e um dos criadores do Moderno Expressionismo (O Grito, Morte no Quarto - ambas no museu de Oslo), apresentando sua obra grandes afinidades com a de Ensor, seu contemporâneo belga.

INTERPRETAÇÃO DE CEFALIA TRÁGICA :
possivelmente a pessoa retratada está tendo uma crise muito forte, cruciante de dor de cabeça. Durante a mesma não consegue ficar parado. Agita-se. Parece que as pupilas estão assimétricas. É noite, pode ser que a cefaléia o tenha acordado.

Diagnóstico:
CEFALÉIA EM SALVAS.

sumário

Espaço do leitor

Migrânea basilar com comprometimento cortical importante

1º Estudo Nacional sobre Cefaléia na Revista Cephalalgia

Trabalhos inéditos

Novas drogas para o tratamento das crises de migrânea

Epidemiologia da migrânea e cefaléia tipo tensional entre estudantes universitários

Artigos de Revisão

Dor ocular em neurologia

Migrânea menstrual

Resumos de artigos

Cefaléia após trauma cervical do tipo chicote: Um estudo de corte histórico fora do contexto médico-legal

Síndrome de Horner dolorosa secundária a arterite da artéria carótida interna

Gênero, Cefaléia Primária e Estresse Psicológico

Epidemiologia da cefaléia tipo tensional em Santiago, Chile:

Um estudo de prevalência

Tratamento agudo com sumatriptano para cefaléia em salvas:

Achados de um estudo prospectivo de um ano de duração

Prognóstico a longo prazo da terapia antimigranosa

Valor preditivo do teste da nitroglicerina fronto-temporal

The Hypnic ("Alarm Clock") Headache Syndrome

Epidemiologia da Migrânea em Santiago, Chile:

Um estudo da prevalência

Relaxamento com Biofeedback assistido para jovens adolescentes com cefaléia do tipo tensional

Sintomas premonitórios e prodrômicos na cefaléia em salvas

Resumos de tese

Cefaléia primária em adolescentes:

Características clínicas

Estudos neurofisiológicos e neuropsicológicos em pacientes com trauma cervical do tipo chicote e trauma craniano mínimo

Seções

Editorial	2
Carta do Presidente	3
Espaço do Leitor	4
Artigos Inéditos	7
Artigos de Revisão	17
Resumos de Artigos	22
Resumos de Teses	33
Em Gotas	35